

Acis nicaeensis (Ard.) Lledo et al.

Synonymes : *Leucojum nicaeense* Ard. ;
L. hiemale auct. non DC.

Amaryllidaceae (incl. *Alliaceae*)

Nivéole de Nice

Sténoméditerranéen nord-ouest,
endémique des Alpes maritimes

Février à mai

Description

Plante herbacée bulbeuse, pérenne, à hampe florale creuse de petite taille (10-20 cm), fugace.

Feuilles linéaires, très étroites (0,2-0,5 cm), semi-cylindriques, beaucoup plus longues que la hampe florale (jusqu'à 30 cm), s'insérant au niveau du bulbe.

Fleur blanche pendante, généralement solitaire (parfois 2 ou 3), au sommet de la hampe, constituée de 6 tépales et d'un style un peu plus long que les 6 étamines ; présence d'une spathe parcheminée divisée en 2 segments linéaires.

Fruits (capsules) renflés à trois loges, de la forme d'une petite olive ; graines noires et lisses munies d'une strophiole.

Se distingue de la nivéole de Fabre (*Acis fabrei* (Quézel et Girerd) Lledo et al., endémique du bassin de la Nesque dans le Vaucluse) par un style dépassant généralement les anthères de moins de 1 mm et des feuilles adultes moins larges.

| | | |
|----------|---------------------|---------|
| Géophyte | Vivace polycarpique | 2n = 18 |
|----------|---------------------|---------|





Monaco (K. Diadema)

Aire de répartition

Générale

Acis nicaeensis est une espèce endémique stricte du littoral et de l'arrière-pays immédiat des Alpes maritimes dont l'aire s'étend depuis la Ligurie occidentale près de la frontière française à Vintimille jusqu'en limite des Préalpes provençales orientales en France (col de Vence).



Statuts Protection nationale – Directive Habitat – Livre rouge tome I

Menaces principales

