

Les variétés fruitières caractéristiques d'Île-de-France



Pommes

| | |
|-------------------------|----|
| Barré | 32 |
| Barré à Grappes | 33 |
| Barré d'Anjou | 34 |
| Bassard | 35 |
| Belle de Pontoise | 36 |
| Belle Joséphine | 37 |
| Bondy | 38 |
| Chéron | 39 |
| Datte | 40 |
| Faro | 41 |
| Feuillermorte | 42 |
| Fleuritard | 43 |
| Gendreville | 44 |
| Gros barré | 45 |
| Hochet | 46 |
| Hollande | 47 |

| | |
|-----------------------|----|
| Jean Huré | 48 |
| Jeanne Hardy | 49 |
| Marie Madeleine | 50 |
| Michelotte | 51 |
| Nouvelle France | 52 |
| Reinette Abry | 53 |
| Rousseau | 54 |
| Vérité | 55 |
| Vincent | 56 |

Poires

| | |
|------------------------------|----|
| Batisto | 57 |
| Bési de Chaumontel | 58 |
| Beurré Oscar Désouches | 59 |
| Bocage gris | 60 |
| Chat rôti | 61 |
| Pisseresse | 62 |
| Poire de Carrière | 63 |

Les variétés sont illustrées par des photos et une coupe méridienne du fruit. L'existence de taches et autres marques à la surface des fruits traduit le fait que les variétés décrites sont issues de vergers peu ou non traités. Elles peuvent aussi être le fait d'une certaine fragilité du fruit, ce qui n'a pas de répercussion sur sa qualité.



Fruit de table




Fruit à cuire



Fruit à jus



Autre usage




Taille du fruit

Barré

Pomme originaire de la Brie ; elle est répandue dans toute la Brie seine-et-marnaise.

Variété peu sensible aux maladies.



Fruit : moyen, sphérique aplati, avec un pourtour irrégulier.

Épiderme : blanc-jaune, lavé de rouge et strié de rose et de violet sur la presque totalité du fruit. Lenticelles peu nombreuses ; russeting partiel, autour du pédoncule.

Ceil : situé dans une cuvette faiblement côtelée et peu profonde.

Pédoncule : court et trapu, dans une cavité profonde.

Chair : neige, tendre, à la texture intermédiaire (entre fine et grossière) ; faiblement sucrée et faiblement acide.

Qualité : fruit juteux, parfumé et peu goûteux.

Maturité de cueillette : tardive.

Durée de conservation : longue.

Période de floraison : tardive.

Caractère particulier : loges carpellaires, de forme lancéolée et semi-ouvertes.

Usages : fruit à deux fins, pour la table et pour le jus. Bon fruit à cidre.

Barré à Grappes

Pomme originaire de la Brie ; elle est répandue dans toute la Brie seine-et-marnaise.

Variété très productive.



Fruit : petit, conique arrondi, avec un pourtour régulier.

Épiderme : blanc-vert, lavé de rouge foncé sur la moitié du fruit. Lenticelles très nombreuses ; sans russetting.

Œil : situé dans une cuvette non côtelée et peu profonde.

Pédoncule : moyennement long et fin, dans une cavité moyennement profonde.

Chair : neige, ferme, à la texture fine ; faiblement sucrée et acide.

Qualité : fruit juteux, parfumé et goûteux.

Maturité de cueillette : très tardive.

Durée de conservation : longue.

Période de floraison : tardive.

Caractère particulier : fruits disposés en grappe le long des rameaux.



Usages : fruit à jus et à cidre. Sa taille trop petite l'exclut de la table bien que ce soit un bon fruit.